

## **Elastik-behandling af hæmorider**

Hæmorider er åreknuder i endetarmsåbningen. I lette tilfælde sidder de indenfor, og kun slimhinden falder frem. Hæmorider kan også sidde udenfor endetarmsåbningen (ydre hæmorider). Disse kan skrumpes, således at hæmoriden forsvinder, og kun den overskydende hud bliver tilbage. Dette kaldes marisker.

### **Elastik-behandling:**

De indre hæmorider kan elastikbehandles. Herved afsnøres hæmoriden, og den vil da visne og falde af i løbet af 3-10 dage. Indgrebet er smertefrit.

### **Efter elastikbehandlingen:**

Det er normalt i 1 til 2 døgn at have lettere trykkende smerter/fornemmelse i endetarmen, afføringstrang og en smule blødning fra tarmen. Smerterne kan afhjælpes med Panodil og Iprex. Der er ingen problemer med at komme af med afføringen. Især hos mænd kan der i de første dage forekomme hyppig vandladningstrang og trykken over blæren. Du må tørre dig som vanligt efter toiletbesøg. Der kan føles stramning og afføringstrang det første ½ til hele døgn. Hvis ubehag tages håndkøbsmedicin (Panodil, Kodimagnyl eller Ibuprofen).

Efter 3-10 dage falder den lille sorte elastik af i forbindelse med afføring. Også på dette tidspunkt kan der være en smule blødning og svie. Dette er harmløst og forsvinder. I meget sjældne tilfælde kan der opstå kraftig blødning eller stærke smerter i endetarmen. Skulle dette ske, må du ringe til klinikken i åbningstiden. Uden for åbningstiden bedes du kontakte 1813.

### **Ambulant kontrol:**

Du vil få en tid til kontrol 3-4 uger efter elastikbehandlingen. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.

Resultatet af undersøgelsen fremsendes til din egen læge.