

Operation i lokalbedøvelse

Før operationen:

Hvis du har pacemaker oplyses dette til klinikken. Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (fx Magnyl, Clopidogrel, Marevan el. lign.) skal dette pauseres 5 dage før operationen i samråd med din egen læge. Undlad at smøre crème på huden.

Operationen:

Huden desinficeres med Klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos praktiserende læge.

Efter operationen:

Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbs præparater Paracetamol, Kodimagnyl eller evt. Ibuprofen.

Forbinding:

Forbindingen fjernes dagen efter operationen (med mindre andet er aftalt). Ved behov kan såret der efter dækkes med Micropore (købes på apoteket).

Restriktioner:

Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i hvad man må, dog frarådes karbadning/svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet og såret er helet.

Komplikationer:

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst sjældne tilfælde kommer der betændelse. I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede. Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38.5) kontaktes klinikken eller 1813.

Resultatet af operationen fremsendes til din egen.